

Μονογραφίες των καλλιεργούμενων στην Ελλάδα ποικιλιών καρυδιάς

Δρ Δήμος Ρουσας, Τακτικός Ερευνητής

Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών



Οι μονογραφίες των ποικιλιών καρυδιάς, που παρατίθενται στη συνέχεια, έχουν προκύψει από αξιολόγηση των ποικιλιών καρυδιάς πειραματικών συλλογών, που βρίσκονται εγκατεστημένες στο αγρόκτημα του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών (ΣΓΕΒ) Φθιώτιδας του ΕΘΙΑΓΕ. Ο ΣΓΕΒ είναι Διατηρητής των περιγραφομένων παρακάτω ποικιλιών καρυδιάς, με κωδικό αριθμό Διατηρητή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών : 0004.

Οι ποικιλίες καρυδιάς διακρίνονται σε πλαγιώκαρπες, δηλαδή ποικιλίες που καρποφορούν και στους πλευρικούς οφθαλμούς των ετήσιων βλαστών και σε αρδύκαρπες, δηλαδή ποικιλίες που στους ετήσιους βλαστούς καρποφορούν μόνο στον ακραίο οφθαλμό ή και στον οφθαλμό των αμέσως κατώτερο του ακραίου.

Οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην έναρξη βλάστησης, εποχή ανθοφορίας, εποχή ωρίμανσης καρπού κ.λπ., είναι οι μέσοι όροι επαρκών ετών παρατηρήσεων και για να είναι μεταξύ τους συγκρίσιμοι αφορούν την ίδια χρονική περίοδο, 1995 –2005.

Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων παρατίθεται συνοπτικός πίνακας με τα χυριότερα μετεωρολογικά στοιχεία της περιόδου 1995 – 2005, μετεωρολογικού κλωβού εγκατεστημένου στο αγρόκτημα του ΣΓΕΒ.

Μέσοι όροι των κυριοτέρων μετεωρολογικών στοιχείων και απόλυτες τιμές μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας περιόδου 1995 – 2005, του μετεωρολογικού κλωβού του ΣΓΕ Βαρδατών

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 1995-2005	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΟΚΤ	ΝΟΕΜ	ΔΕΚ
Μ.Ο. ΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ °C	6,7	8,1	10,6	14,6	20,4	25,0	26,3	25,4	21,6	17,2	11,9	8,0
Μ.Ο. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ °C	19,1	20,2	24,5	27,8	32,0	37,0	37,7	36,6	34,7	28,9	24,3	20,4
ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ °C	24,0	22,0	33,5	30,0	35,0	39,3	41,3	40,2	38,8	33,2	27,5	25,4
Μ.Ο. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ °C	-3,9	-3,8	-1,9	0,9	6,1	11,1	14,2	13,5	8,8	2,8	-0,4	-3,8
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ °C	-7,6	-11,5	-6,0	-4,0	1,8	7,5	11,0	9,0	2,0	-4,0	-5,1	-12,4
Μ.Ο. ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ %	79,7	75,2	72,8	71,3	68,4	62,3	66,0	67,4	68,7	75,2	80,1	82,5
Μ.Ο. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ mm	78,2	54,0	74,4	35,6	33,9	9,8	29,2	15,9	22,4	34,9	86,2	101,7

I. ΠΛΑΓΙΟΚΑΡΠΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ



ΠΟΙΚΙΛΙΑ: SERR
ΚΑΤΑΓΩΓΗ: Καλιφόρνια. Διασταύρωση Payne x PI 159568
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Πανεπιστήμιο DAVIS Καλιφόρνια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΑΡΟΥ

Καρποφορία: Πλαγιώναρη με βαθμό πλαγιοκαρπίας 55 – 60 %
 Μορφή κόμης: Ήμιοφθόκλαδη
 Ζωηρότητα βλάστησης: ζωηρή
 Χαρακτηρισμός ποικιλίας: Πρώιμη
 Έναρξη βλάστησης: Πρώιμη, 22/3.
 Εποχή ανθοφορίας θηλέων (έναρξη-λήξη): 14/4 έως 24/4
 Εποχή ανθοφορίας ιούλων (έναρξη-λήξη): 9/4 έως 18/4
 Χαρακτηρισμός ανθοφορίας: πρώτανδρη
 Εποχή ωρίμανσης καρπού: Πρώιμη, 18 έως 26 Σεπτεμβρίου
 Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: γρήγορη - πρώτοι καρποί συνήθως από τον δεύτερο χρόνο φύτευσης
 Ταχύτητα εμφάνισης Ιούλων: γρήγορη (συνήθως στον 4ο χρόνο)
 Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 11 έτος
 Παραγωγικότητα: καλή, με διακυμάνσεις από πολύ καλή έως μέτρια.
 Ενασθήσια στη βακτηρίωση: Μικρή
 Ενασθήσια στην ανθράκωση: Μικρή έως μέση
 Προσβολές από καρπόνιαψα: Απαιτείται καταπολέμηση
 Επικονιαστές: Pedro, Hartley, Chandler
 Προσοχή σύμφωνα με έρευνες του Πανεπιστήμιου DAVIS, υπερβολική ποσότητα γύρης προκαλεί αποβολή ανθέων της SERR, γ' αυτό συνιστάται η φύτευσή της με χαμηλό ποσοστό επικονιαστών (1 – 2%) ή χωρίς επικονιαστές. Ο ΣΓΕΒ οινιστά χαμηλό ποσοστό (2%) επικονιαστών, των Ελληνικών επιλογών : A- EK1 ή A - EΣ25.
 Σχάση περικαρπίου: Εύκολη
 Αντοχή καρπού στο ηλιόκαυμα: αρκετά καλή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ

Σχήμα καρυδιού με κέλυφος: ωοειδές ή επίμηκες κοντό, με αρκετά ισχυρή αιχμή
 Εμφάνιση καρυδιού με κέλυφος: καλή
 Μέσο βάρος καρυδιού με κέλυφος: 11 – 12 g
 Συγκόλληση βαλβίδων κελύφους: ισχυρή
 Ποσοστό ψήχας: 52 - 57%.
 Χρωματισμός ψήχας: Λευκοκατίρινος, στα πεδινά κατηγορία I και στα ημιορεινά κατηγορία Extra και I.
 Ποιότητα ψήχας: καλή έως πολύ καλή.
 Αποχωρισμός ψήχας από το κέλυφος: Εύκολος

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ

Κλασική ποικιλία, πρώιμη, παραγωγική αλλά με διακυμάνσεις στην παραγωγή, με πολύ καλά καρπολογικά χαρακτηριστικά και καλή έως πολύ καλή ποιότητα ψήχας, κατάλληλη σαν κύρια ποικιλία για πεδινές και ημιορεινές περιοχές όπου ο τελευταίος εαρινός παγετός σημειεύνεται μέχρι 25 Μαρτίου.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ: GUSTINE (Γκουστίν)
ΚΑΤΑΓΩΓΗ: Καλιφόρνια. Διασταύρωση Waterloo x Payne
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Πανεπιστήμιο DAVIS Καλιφόρνια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΑΡΟΥ

Καρποφορία: Πλαγιόκαρπη με μεγάλο βαθμό πλαγιοκαρπίας (85 - 90%)
 Μορφή κόμης: Πλαγιόκλαδη
 Ζωηρότητα βλάστησης: σχετικά αδύνατη
 Έναρξη βλάστησης: Πρώιμη, 24/3
 Εποχή ανθοφορίας θηλέων (έναρξη-λήξη): 15/4 έως 26/4
 Εποχή ανθοφορίας ιούλων (έναρξη-λήξη): 7/4 έως 17/4
 Χαρακτηρισμός ανθοφορίας: πρώτανδρη
 Εποχή ωρίμανσης καρπού: 20/9 έως 28/9
 Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: πολύ γρήγορη - πρώτοι καρποί από τον πρώτο χρόνο φύτευσης
 Ταχύτητα εμφάνισης Ιούλων: γρήγορη (συνήθως στο 3ο και οπωσδήποτε στο 4ο χρόνο)
 Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 10 έτος
 Παραγωγικότητα: Πολύ καλή
 Ενασθήσια στη βακτηρίωση: αρκετά ευαίσθητη, γενικά θεωρείται ευαίσθητη ποικιλία.
 Ενασθήσια στην ανθράκωση: Μέση
 Προσβολές από καρπόνιαψα: Απαιτείται καταπολέμηση
 Επικονιαστές: Pedro, Hartley, Chandler
 Σχάση περικαρπίου: Δύσκολη και χρειάζεται προσοχή να μην καθυστερήσει η συγκομιδή, γιατί ο καρπός ωριμάζει και αποκολλάται εστερικά από το περικάρπιο πριν αυτό πάρουσιάσει εξωτερικά σχισματά.
 Αντοχή καρπού στο ηλιόκαυμα: Ευαίσθητη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ

Σχήμα καρυδιού με κέλυφος: ωοειδές
 Εμφάνιση καρυδιού με κέλυφος: καλή
 Μέσο βάρος καρυδιού με κέλυφος: 11 έως 12 g
 Συγκόλληση βαλβίδων κελύφους: αρκετά ισχυρή
 Ποσοστό ψήχας: 48 - 52%
 Χρωματισμός ψήχας: Λευκοκατίρινος, κατηγορία I
 Ποιότητα ψήχας: καλή
 Αποχωρισμός ψήχας από το κέλυφος: Εύκολος

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ

Πολύ παραγωγική πρώιμη ποικιλία, ευαίσθητη όμως στη βακτηρίωση και στο ηλιόκαυμα του καρπού, κατάλληλη σαν κύρια ποικιλία για πεδινές και ημιορεινές περιοχές όπου ο τελευταίος εαρινός παγετός σημειώνεται μέχρι 27 Μαρτίου.



ΠΟΙΚΙΛΙΑ: ΗΛΙΑΝΑ
ΚΑΤΑΓΩΓΗ: Ελλάδα, προήλθε από ελεύθερη επικονίαση της Gustine το 1986.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: ΕΘΙΑΓΕ/ΣΓΕ ΒΑΡΔΑΤΩΝ ΦΘ/ΔΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΑΡΟΥ

Καρποφορία: Πλαγιόκαρπη με μεγάλο βαθμό πλαγιοκαρπίας (80 - 85%)
Μορφή κόμης: Ήμιορθόκλαδη έως ημιπλαγιόκλαδη
Ζωηρότητα βλάστησης: μέτρια έως καλή
Έναρξη Βλάστησης: Μεσοπώιμη, 29/3
Εποχή ανθοφορίας θηλέων (έναρξη-λήξη): 18/4 - 30/4
Εποχή ανθοφορίας ιούλων (έναρξη-λήξη): 12/4 - 22/4
Χαρακτηρισμός ανθοφορίας: πρώτανδρη
Εποχή ωρίμανσης καρπού: 19/9 - 27/9
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: Πολύ γρήγορη, εμφάνιση καρπών από το πρώτο έτος φύτευσης
Ταχύτητα εμφάνισης Ιούλων: γρήγορη (συνήθως στον 3ο και οπωσδήποτε στο 4ο χρόνο)
Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 10 έτος
Παραγωγικότητα: πολύ καλή
Εναιοθησία στη βακτηρίωση: μικρή έως μέση
Εναιοθησία στην ανθράκωση: μικρή
Προσβολές από καρπόναφα: Απαιτείται καταπολέμηση
Επικονιαστές: Chandler, Pedro, Hartley
Σχάση περικαρπίου: πολύ καλή
Αντοχή καρπού στο ηλιόκαυμα: καλή, πολύ καλύτερη από Gustine και Vina

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ

Σχήμα καρυδιού με κέλυφος: Ελλειπτικό
Εμφάνιση καρυδιού με κέλυφος: Ελκυστική, καλή
Μέσο βάρος καρυδιού με κέλυφος: 13 - 14 g
Συγκόλληση βαλβίδων κελύφους: μέση
Ποσοστό ψίχας: 50 - 54%
Χρωματισμός ψίχας: Λευκοκίτρινος, κατηγορία I και Extra
Ποιότητα ψίχας: Καλή έως πολύ καλή
Αποχωρισμός ψίχας από το κέλυφος: Εύκολος

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ

Πολύ παραγωγική, με πολύ καλό γέμισμα ψίχας με ανοικτό λευκοκίτρινο χρώμα, κύρια ποικιλία για πεδινές και ημιορεινές περιοχές όπου ο τελευταίος εαρινός παγετός σημειώνεται έως τέλη Μαρτίου. Υπερτερεί της Gustine και της Vina σε πολλά χαρακτηριστικά.



ΠΟΙΚΙΛΙΑ: VINA (Βίνα)
ΚΑΤΑΓΩΓΗ: Καλιφόρνια. Διασταύρωση Franquette x Payne
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Πανεπιστήμιο DAVIS Καλιφόρνια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥ

Καρποφορία: Πλαγιόκαρπη με μεγάλο βαθμό πλαγιοκαρπίας 80%
Μορφή κόμης: Πλαγιόκλαδη έως ημιπλαγιόκλαδη
Ζωηρότητα βλάστησης: αδύνατη έως σχετικά αδύνατη
Έναρξη βλάστησης: Μεσοπώιμη, 31 Μαρτίου
Εποχή ανθοφορίας θηλέων (έναρξη-λήξη): 22/4 - 3/5
Εποχή ανθοφορίας ιούλων (έναρξη-λήξη): 15/4 - 25/4
Χαρακτηρισμός ανθοφορίας: πρώτανδρη
Εποχή ωρίμανσης καρπού: 19/9 - 27/9
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: Πολύ γρήγορη, εμφάνιση καρπών από το πρώτο έτος φύτευσης
Ταχύτητα εμφάνισης Ιούλων: γρήγορη (συνήθως στον 3ο και οπωσδήποτε στο 4ο χρόνο)
Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 9 έτος
Παραγωγικότητα: Καλή έως πολύ καλή
Εναιοθησία στη βακτηρίωση: Μέση. Θεωρείται εναίσθητη στη βακτηρίωση.
Εναιοθησία στην ανθράκωση: Μικρή έως μέση.
Προσβολές από καρπόναφα: Απαιτείται καταπολέμηση
Επικονιαστές: Chandler, Pedro, Hartley
Σχάση περικαρπίου: πολύ καλή
Αντοχή καρπού στο ηλιόκαυμα: ευαίσθητη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ

Σχήμα καρυδιού με κέλυφος: Καλή, ελκυστική
Μέσο βάρος καρυδιού με κέλυφος: 11 - 12,5 g
Συγκόλληση βαλβίδων κελύφους: σχετικά αδύνατη
Ποσοστό ψίχας: 47% - 51%
Χρωματισμός ψίχας: Κιτρινόλευκος, μικρό ποσοστό (15%) κατηγορία Extra, μεγαλύτερο ποσοστό (55%) κατηγορία I και αρκετό ποσοστό (30%) κατηγορία II
Ποιότητα ψίχας: Μέτρια έως αρκετά καλή
Αποχωρισμός ψίχας από το κέλυφος: Εύκολος

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ

Πολύ παραγωγική ποικιλία, ευαίσθητη στη βακτηρίωση και στο ηλιόκαυμα. Στις ημιορεινές περιοχές έχει καλύτερο χρωματισμό ψίχας από τις πεδινές. Κατάλληλη σαν κύρια ποικιλία για ημιορεινές περιοχές όπου ο τελευταίος εαρινός παγετός σημειώνεται έως τις 5 Απριλίου.



ΠΟΙΚΙΛΙΑ: PEDRO (Πέντρο)

ΚΑΤΑΓΩΓΗ: Καλιφόρνια.

Διασταύρωση Conway - Mayette x Payne

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Πανεπιστήμιο DAVIS Καλιφόρνια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥ

Καρποφορία: Πλαγιόκαρπη με μεγάλο βαθμό πλαγιοκαρπίας (70 - 80%)

Μορφή κόμης: Ημιπλαγιόκαλαδη - πλαγιόκαλαδη

Ζωηρότητα βλάστησης: αδύνατη

Έναρξη βλάστησης: 4/4 (κανονικής εποχής ή μεσοοψυχική)

Εποχή ανθοφορίας θηλέων (έναρξη-λήξη): 24/4 - 6/5

Εποχή ανθοφορίας ιούλων (έναρξη-λήξη): 16/4 - 28/4

Χαρακτηρισμός ανθοφορίας: πρόστανδρη

Εποχή ωρμάνσης καρπού: 23/9 έως 30/9

Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: Πολύ γρήγορη, εμφάνιση πρώτων καρπών από τον πρώτο χρόνο και οπωσδήποτε από τον δεύτερο χρόνο φύτευσης.

Ταχύτητα εμφάνισης Ιούλων: Γρήγορη (συνήθως στον 3ο και οπωσδήποτε στο 4ο χρόνο). - Σχηματίζει μεγαλώνοντας μεγάλο αριθμό ιούλων.

Εισόδος στην πλήρη καρποφορία: 10 έτος

Παραγωγικότητα: Μεγάλη έως πολύ μεγάλη

Εναιασθησία στη βακτηρίωση: Μικρή έως μέση. Θεωρείται εναιασθητη.

Εναιασθησία στην ανθράκωση: Μέτρια

Προσβολές από καρπόναψα: Απαιτείται καταπολέμηση

Επικονιαστές: Franquette ή Fernette

Σχάση περικαρπίου: πολύ καλή

Αντοχή καρπού στο ηλιόκαυμα: αρκετά ευαισθητη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ

Σχήμα καρυδιού με κέλυφος: ωοειδές έως σφαιρικοειδές

Εμφάνιση καρυδιού με κέλυφος: Καλή

Μέσος βάρος καρυδιού με κέλυφος: 11,5 έως 13,5 g

Συγκόλληση βαλβίδων κελύφους: σχετικά αδύνατη

Ποσοστό ψύχας: 46% - 50%

Χρωματισμός ψύχας: Ανάλογα με το έτος από ανοικτοκίτρινος με καστανές νευρώσεις έως καστανός ανοικτός.

Ποιότητα ψύχας: Μέση έως καλή

Αποχωρισμός ψύχας από το κέλυφος: Εύκολος

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ

Πολύ παραγωγική ποικιλία, στις πεδινές περιοχές υστερεί στο χρωματισμό της επιδεομίδας της ψύχας (καστανός), ενώ είναι κατάλληλη για ημιορεινές και ορεινές περιοχές, όπου ο τελευταίος εαρινός παγετός σημειεύνεται έως τις 10 Απριλίου.

Ως προς την εκλογή ποικιλίας προς φύτευση υφίσταται τον ανταγωνισμό των ποικιλιών Hartley, Lara και κυρίως της Chandler.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ: CHANDLER (Τσάντλερ)

ΚΑΤΑΓΩΓΗ: Καλιφόρνια. Διασταύρωση Pedro x UC 56 - 224

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Πανεπιστήμιο DAVIS Καλιφόρνια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥ

Καρποφορία: Πλαγιόκαρπη με μεγάλο βαθμό πλαγιοκαρπίας (90%)

Μορφή κόμης: Ημιπλαγιόκαλαδη

Ζωηρότητα βλάστησης: αδύνατη έως μεση

Έναρξη βλάστησης: 6/4 (μεσοδύψιμη)

Εποχή ανθοφορίας θηλέων (έναρξη-λήξη): 27/4-9/5

Εποχή ανθοφορίας ιούλων (έναρξη-λήξη): 18/4-29/4

Χαρακτηρισμός ανθοφορίας: πρόστανδρη

Εποχή ωρμάνσης καρπού: 28/9 - 6/10.

Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: Πολύ γρήγορη, εμφάνιση πρώτων καρπών από τον πρώτο χρόνο.

Ταχύτητα εμφάνισης Ιούλων: Γρήγορη (συνήθως στον 4ο χρόνο)

Εισόδος στην πλήρη καρποφορία: 10 έτος

Παραγωγικότητα: Μεγάλη έως πολύ μεγάλη

Εναιασθησία στη βακτηρίωση: πολύ μικρή, παρότι θεωρείται ευαισθητη.

Εναιασθησία στην ανθράκωση: Ελάχιστη.

Προσβολές από καρπόναψα: Απαιτείται καταπολέμηση

Επικονιαστές: Κύριοι (4%): Franquette ή Fernette. Συμπληρωματικοί (1%): Meylanaise ή Rond de Montignac ή Fornor.

Σχάση περικαρπίου: πολύ καλή

Αντοχή καρπού στο ηλιόκαυμα: πολύ καλή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ

Σχήμα καρυδιού με κέλυφος: Επίμηκες κοντό

Εμφάνιση καρυδιού με κέλυφος: Πολύ Καλή, πολύ ελκυστική

Μέσος βάρος καρυδιού με κέλυφος: 11,5 έως 13 g

Συγκόλληση βαλβίδων κελύφους: σχετικά αδύνατη

Ποσοστό ψύχας: 48% - 52%

Χρωματισμός ψύχας: Πολύ ανοικτόχρωμος, ελκυστικός, κατηγορία Extra

Ποιότητα ψύχας: Καλή

Αποχωρισμός ψύχας από το κέλυφος: Εύκολος

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ

Ποικιλία μεγάλης αξίας, παραγωγική, πλαγιόκαρπη, ημιόψιμη, υπερτερεί στον τόνο των άλλων στον ανοικτόχρωμο χρωματισμό της επιδεομίδας της ψύχας και στην ελκυστική εμφάνιση του κελύφους. Καταλλήλη για ημιορεινές και πολλές ορεινές περιοχές όπου ο τελευταίος εαρινός παγετός σημειεύεται έως τις 12 Απριλίου.

II. ΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ



ΠΟΙΚΙΛΙΑ: LARA® (προστατευόμενη ποικιλία)
ΚΑΤΑΓΩΓΗ: Γαλλία, προήλθε από ελεύθερη επικονίαση της Payne
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Pépinières de Lalanne, Gironde

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΑΡΟΥ

Καρποφορία: Πλαγιώναρη με μεγάλο βαθμό πλαγιοκαρπίας (80%)
Μορφή κόδιμης: Ημιπλαγιόκλαδη
Ζωηρότητα βλάστησης: Σχετικά αδύνατη έως μεση
Έναρξη βλάστησης: 7/4 (μεσοδύψιμη)
Εποχή ανθοφορίας θηλέων (έναρξη-λήξη): 28/4 - 10/5
Εποχή ανθοφορίας ιούλων (έναρξη-λήξη): 20/4 - 30/4
Χαρακτηρισμός ανθοφορίας: πρώτανδρη
Εποχή ωρίμανσης καρπού: 28/9 - 6/10. (3 - 13/10)
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: Πολύ γρήγορη, εμφάνιση πρώτων καρπών από τον πρώτο χρόνο
Ταχύτητα εμφάνισης Ιούλων: Γρήγορη (συνήθως στον 4ο χρόνο)
Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 10 έτος
Παραγωγικότητα: Μεγάλη έως πολύ μεγάλη
Ευαισθησία στη βακτηρίωση: Δεν παρουσίασε ευαισθησία
Ευαισθησία στην ανθράκωση: Δεν παρουσίασε ευαισθησία
Προσβολές από καρπόκαψα: Απαντέται καταπολέμηση
Επικονιαστές: Κύριοι (4%): Franquette ή Fernette. Συμπληρωματικοί (1%): Meylannaise ή Rond de Montignac ή Fernor.
Σχάση περικαρπίου: πολύ καλή
Αντοχή καρπού στο ηλιόκαυμα: πολύ καλή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ

Σχήμα καρυδιού με κέλυφος: Σφαιροειδές
Εμφάνιση καρυδιού με κέλυφος: Καλή, ελκυστική
Μέσο βάρος καρυδιού με κέλυφος: 13 έως 14 g
Συγκόλληση βαλβίδων κελύφους: μέτρια
Ποσοστό ψύχας: 48% - 52%
Χρωματισμός ψύχας: ανοικτόχρωμος, κατηγορία I
Ποιότητα ψύχας: Καλή
Αποχωρισμός ψύχας από το κέλυφος: Εύκολος

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ

Παραγωγική πλαγιώναρη ημιόψιμη ποικιλία, μεγαλόκαρπη, κατάλληλη για ημιορεινές και πολλές ορεινές περιοχές.



ΠΟΙΚΙΛΙΑ: HARTLEY (Χάρτλεϊ)
ΚΑΤΑΓΩΓΗ: Καλιφόρνια, επιλογή από σποροφυτικό πληθυσμό καρυδιάς, που έγινε το 1915.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Mr and Mrs John Hartley

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΑΡΟΥ


Καρποφορία: Ενδιάμεσος τύπος με μικρό ποσοστό (5-10%) πλαγιοκαρπίας
Μορφή κόδιμης: Ημιορθόκλαδη
Ζωηρότητα βλάστησης: αρκετά μεγάλη έως μεγάλη
Έναρξη βλάστησης: 5/4 (ημιόψιμη)
Εποχή ανθοφορίας θηλέων (έναρξη-λήξη): 25/4 - 6/5
Εποχή ανθοφορίας ιούλων (έναρξη-λήξη): 17/4 - 28/4
Χαρακτηρισμός ανθοφορίας: πρώτανδρη
Εποχή ωρίμανσης καρπού: 25/9 - 4/10
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: Γρήγορη, συνήθως οι πρώτοι καρποί εμφανίζονται στο τρίτο έτος.
Ταχύτητα εμφάνισης Ιούλων: αρκετά γρήγορη, στο τέταρτο ή πέμπτο έτος .Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 13 έτος
Παραγωγικότητα: πολύ καλή στα εισέλθει στην πλήρη καρποφορία.
Ευαισθησία στη βακτηρίωση: δεν παρουσίασε ευαισθησία
Ευαισθησία στην ανθράκωση: Μικρή.
Προσβολές από καρπόκαψα: Απαντέται καταπολέμηση
Επικονιαστές: Franquette
Σχάση περικαρπίου: πολύ καλή
Αντοχή καρπού στο ηλιόκαυμα: πολύ καλή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ

Σχήμα καρυδιού με κέλυφος: Κολουροκωνικό με αιχμητή άκρη
Εμφάνιση καρυδιού με κέλυφος: Καλή έως πολύ καλή, Ελκυστική
Μέσο βάρος καρυδιού με κέλυφος: 11,5 - 13,5 g
Συγκόλληση βαλβίδων κελύφους: αρκετά ισχυρή
Ποσοστό ψύχας: 45% - 49%
Χρωματισμός ψύχας: Λευκοκαίτοινος
Ποιότητα ψύχας: Καλή
Αποχωρισμός ψύχας από το κέλυφος: Εύκολος

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ

Κλασική ποικιλία, παραγωγική, ημιόψιμη, κύρια ποικιλία για ημιορεινές και πολλές ορεινές περιοχές, καθώς και πεδινές περιοχές της Βορείου Ελλάδας όπου ο τελευταίος παγετός σημειώνεται μεχρι 10 Απριλίου.



ΠΟΙΚΙΛΙΑ: RONDE DE MONTIGNAC
ΚΑΤΑΓΩΓΗ: Γαλλία, περιοχή Dordogne

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥ

Καρποφορία: Ακρόναρη
Μορφή κόμης: Ήμιοδόκλαδη
Ζωηρότητα βλάστησης: αρκετά ζωηρή
Έναρξη βλάστησης: 23/4
Εποχή ανθοφορίας θηλέων (έναρξη-λήξη): 9/5 έως 22/5
Εποχή ανθοφορίας ιούλων (έναρξη-λήξη): 9/5 έως 21/5
Χαρακτηρισμός ανθοφορίας: ομόργανη
Εποχή ωρίμανσης καρπού: 2/10 έως 8/10
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: Μέση έως αρκετά γοήγορη
Ταχύτητα εμφάνισης Ιούλων: γοήγορη, στο τρίτο ή στο τέταρτο έτος από τη φύτευση
Παραγωγικότητα: καλή
Εναιασθησία στη βακτηρίωση: Δεν παρουσίασε εναιασθησία
Εναιασθησία στην ανθράκωση: Δεν παρουσίασε εναιασθησία
Προσβολές από καρπόκαφα: Απαιτείται καταπολέμηση
Επικονιαστές: δεν απαιτούνται.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ

Σχήμα καρυδιού με κέλυφος: Σφαιροειδές
Εμφάνιση καρυδιού με κέλυφος: αρκετά καλή
Μέσο βάρος καρυδιού με κέλυφος: 10 - 11 g
Συγκόλληση βαλβίδων κελύφους: αρκετά ισχυρή
Ποσοστό ψήχας: 46% - 50%
Χρωματισμός ψήχας: κιτρινόλευκος έως ανοικτός καστανός, κατηγορίας I και II
Ποιότητα ψήχας: Μέση έως αρκετά καλή
Αποχωρισμός ψήχας από το κέλυφος: Εύκολος

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ

Ποικιλία που χρησιμοποιείται μόνο σαν επικονιαστής όψιμων ποικιλιών. Πολύ καλός επικονιαστής της Franquette.



ΠΟΙΚΙΛΙΑ: MEYLANNAISE
ΚΑΤΑΓΩΓΗ: Γαλλία, περιοχή Meylan, πλησίον της Grenoble

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥ

Καρποφορία: Ακρόναρη
Μορφή κόμης: Ήμιοδόκλαδη
Ζωηρότητα βλάστησης: αρκετά ζωηρή
Έναρξη βλάστησης: 19/4
Εποχή ανθοφορίας θηλέων (έναρξη-λήξη): 3/5 έως 16/5
Εποχή ανθοφορίας ιούλων (έναρξη-λήξη): 4/5 έως 15/5
Χαρακτηρισμός ανθοφορίας: ομόργανη, έως ελαφρά Πρωτόγυνη
Εποχή ωρίμανσης καρπού: 4/10 έως 10/10
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: Μέση
Ταχύτητα εμφάνισης Ιούλων: μέση, συνήθως στο πέμπτο έτος
Παραγωγικότητα: Μέση έως καλή
Εναιασθησία στη βακτηρίωση: Δεν παρουσίασε εναιασθησία
Εναιασθησία στην ανθράκωση: Δεν παρουσίασε εναιασθησία
Προσβολές από καρπόκαφα: Απαιτείται καταπολέμηση
Επικονιαστές: δεν απαιτούνται.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ

Σχήμα καρυδιού με κέλυφος: Σφαιροειδές
Εμφάνιση καρυδιού με κέλυφος: Καλή
Μέσο βάρος καρυδιού με κέλυφος: 10,5 - 11,5 g
Συγκόλληση βαλβίδων κελύφους: σχετικά αδύνατη έως μέτρια.
Ποσοστό ψήχας: 43% - 47%
Χρωματισμός ψήχας: κιτρινόλευκος έως ανοικτός καστανός, κατηγορίας I και II
Ποιότητα ψήχας: Μέτρια
Αποχωρισμός ψήχας από το κέλυφος: Εύκολος

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ

Ποικιλία που χρησιμοποιείται μόνο σαν επικονιαστής όψιμων ποικιλιών. Πολύ καλός επικονιαστής της Franquette.



ΠΟΙΚΙΛΙΑ: FRANQUETTE (Φρανκέτ)
ΚΑΤΑΓΩΓΗ: Γαλλία, περιοχή Isère

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥ

Καρποφορία: Ακρόναρη
Μορφή κόμης: Ήμιοδόκλαδη έως ορθόκλαδη
Ζωηρότητα Βλάστησης: ζωηρή
Έναρξη Βλάστησης: άνημη, 20/4 (24 - 26 ημέρες μετά την Gustine)
Εποχή ανθοφορίας θηλέων (έναρξη-λήξη): 5/5 έως 16/5

Εποχή ανθοφορίας ιούλων (έναρξη-λήξη): 27/4 έως 8/5
Χαρακτηρισμός ανθοφορίας: αρκετά πρώτανδρη
Εποχή ωρίμανσης καρπού: 10 έως 20 Οκτωβρίου
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: Μέση
Ταχύτητα εμφάνισης Ιούλων: Μέση, στο πέμπτο έτος.
Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 14 έτος
Παραγωγικότητα: καλή, όταν εισέλθει στην πλήρη παραγωγή
Εναιασθησία στη βακτηρίωση: Δεν παρουσίασε εναιασθησία
Εναιασθησία στην ανθράκωση: Δεν παρουσίασε εναιασθησία

Προσβολές από καρπόκαφα: Απαιτείται καταπολέμηση
Επικονιαστές: Meylannaise, Ronde de Montignac
Αντοχή καρπού στο ηλιόκαψα: πολύ καλή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ

Σχήμα καρυδιού με κέλυφος: Επίμηκες ελλειπτικό
Εμφάνιση καρυδιού με κέλυφος: Καλή
Μέσο βάρος καρυδιού με κέλυφος: 11 - 12 g
Συγκόλληση βαλβίδων κελύφους: ισχυρή
Ποσοστό ψήχας: 43% - 46%
Χρωματισμός ψήχας: Λευκοκάπιρον, κατηγορία Extra και I
Ποιότητα ψήχας: Πολύ καλή
Αποχωρισμός ψήχας από το κέλυφος: Εύκολος

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ

Κλασική ακρόναρη ποικιλία, κύρια ποικιλία για ορεινές περιοχές.
Ανταγωνιστές ποικιλίες: σε ήπιους κλίματος ορεινές περιοχές (500 έως 800m): Hartley, Chandler, Lara. Σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 800 μέτρων είναι η μοναδική κύρια ποικιλία.
Πιθανές ανταγωνιστές ποικιλίες οι νέες (υπό αξιολόγηση) όψιμες πλαγιόκαρπες Γαλλικές ποικιλίες: Fernette, Fernor.